République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A. MIRA - Béjaia

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Département de : Science alimentaire.
Spécialité : Qualité des produits et sécurité alimentaire.

Réf :.....

Mémoire de Fin de Cycle
En vue de l'obtention du diplôme

MASTER

Thème

**EVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES
FEUILLES DE CERTAINES PLANTES
ALIACEAE**

Présenté par :

BOUABBACHE NADIA & KHOUCHANE DALILA

Soutenu le : **25 Juin 2018**

Devant le jury composé de :

M^{me} : AIDLI AMEL

MAA

Président

M^{me} : GUEMGHAR HAYET.

MCA

Encadreur

M^{lle} : BRAHMI NABILA.

MAA

Examineur

Année universitaire : 2017 / 2018

Remerciements

Au terme de notre travail, en premier lieu nous tenant à remercier le bon dieu le tout puissant de nous avoir donné la volonté et le courage, la patience de réaliser ce modeste travail.

Nos profonds remerciements s'accordent à notre promotrice M^{me} Guemgha Hayet, qui à accepter de nous encadrer, pour sa collaboration et son aide nécessaire à la réalisation de notre travail.

Nous remerciant aussi notre Co- promotrice RabeH Samia pour sa disponibilité, conseils et ses encouragements.

Les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous ont fait en acceptant d'évaluer et de juger ce travail, tout particulièrement M^{me} Aidli Amel en qualité de président, ainsi qu'à M^{elle} Brahmi Nabila Examinatrice du jury.

Nous ne sauront oublier enfin de remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin ; à la réalisation ce travail.

Dédicace

Avec l'aide de Dieu le tout puissant et en guise de reconnaissance, Je dédie ce travail :

*Ames chers parents mon père et ma mère qui mon beaucoup encouragé ;
Mes frères et sœurs et ma belle sœur surtout mon frère Riad qui m'a beaucoup aidé dans mon travail ;
A mon mari ;*

Mes adorables enfants ; Asmahane et Nacer Eddin ;

Avec tous mon affection je ne les remerciera jamais assez pour leur soutient.

Dalila

Dédicace

*Avec l'aide de Dieu le tout puissant et en guise de reconnaissance, Je dédie ce
travail :*

Ames chers parents mon père et ma mère qui mon beaucoup encouragé ;

A mon mari ;

Mes adorables enfants ; Yanis et Sara

Mes frères et sœurs surtout mon frère Rezki .

Avec tous mon affection je ne les remercierais jamais assez pour leur soutient.

NADIA

Sommaire

Liste des abréviations

Liste des tableaux

Liste des figures

Partie Théorique

Introduction:.....	1
I. Composés phénoliques :	2
I.1. Biosynthèse des composés phénoliques :.....	2
I.2. Phénols simples et les acides phénoliques :	3
I.3. Flavonoïdes :	3
I.4. Tanins :	4
I.4.1. Tannins hydrolysables :	4
I.4.2 Tannins condensés ou tannins catechiques ou proanthocyanidols :.....	5
I.5. Coumarines :	5
I.7. Lignines et Lignanes :	5
II. Propriétés biologiques des composés phénoliques :.....	5
III.1 Définition et caractéristiques de la famille des Alliées	7
III.1.1 <i>Allium sativum</i> (l'ail):	8
III.1.2. <i>Allium porrum</i> (poireau) :	9
III.1.3. <i>Allium ascalonicum</i> (l'échalote):.....	11
III.1.4. <i>Allium triquetrum</i> (Bibras.....	13
III.1.5. <i>Allium ampeloprasum</i> (poireau sauvage ou terenesth) :.....	15

PARTIE PRATIQUE

Chapitre III

III.1 Préparation du matériel végétale	17
III.1.1. Récolte des plantes :	17
III.2. Détermination de la teneur en humidité :	18
III.3. Préparations des échantillons :.....	18

III.4. Extraction :	19
III.6. Dosage des polyphénols :	22
III.6.1. Dosage des polyphénols totaux :	22
III.6.2. Dosage des flavonoïdes :	23
III.6.3. Dosage des proanthocyanidines :	23
III.7. Activité antioxydante :	24
III.7.1. Pouvoir réducteur :	24
III.7.2. Détermination de l'activité antiradicalaire (DPPH) :	24
III.7.3. Teste «scavenger» sur l'H ₂ O ₂ (peroxyde d'hydrogène) :	25
III.8. Analyse statistiques :	26
Chapitre VI :	
Résultats et Discussions :	27
Conclusion.....	41
Références Bibliographiques.	
Annexes.	

Liste des abréviations

Abs : Absorbance.

Abse : Absorbance de l'échantillon.

Absc : Absorbance du contrôle.

DPPH : Le radical libre 1-diphényl-2-picryl hydrazyl.

EAG : Equivalent Acide Gallique.

EC: Equivalent Catéchine.

EQ : Equivalent Quercétine.

H₂O₂: le peroxyde d'hydrogène.

H₃PMo₁₂O₄₀: Acide phosphomolybdique.

H₃PW₁₂O₄₀: Acide phosphotungstique.

IC₅₀ : Concentration inhibitrice à 50%.

OH : Radical hydroxyle.

pH : Potentiel d'Hydrogène.

PBS : solution tampon phosphate.

PS : poudre sèche.

SAPG.III : Système de classification phylogénique des Angiospermes Groupe II

TH : taux d'humidité.

Liste des tableaux

Tableau I : Lieu et période de récolte des différents échantillons.....18

Tableau II : Résultats de l'IC50 des cinq plantes35

Liste des figures

Figure 1 : Biosynthèse des composés phénoliques le plus largement distribués par la voie de shikimate	3
Figure 2 : Structure générale des flavonoïdes	4
Figure 3 :Structure chimique des acides gallique (A) et ellagique (B)	4
Figure 4:Allium sativum(l'ail) A ; les feuilles, B ; inflorescence, C ; bulbe d'ail, D ; les gousses d'ail.....	8
Figure 5 :Photographie Allium porrum	10
Figure 6 :Photographie Allium ascalonicum.....	12
Figure 7 :Photographie Allium triquetrum.....	13
Figure 8: Photographie Allium polyanthum.....	15
Figure 9 : Photographie de la poudre obtenue à partir des feuilles de l'ail.....	19
Figure 10 :Photographie de l'extraction sous agitation.....	20
Figure11 :Photographie de la filtration.	20
Figure 12 :Photographie de l'extrait liquide.	20
Figure 13 : Extraction des composés phénoliques dans méthanol.....	21
Figure 14 : Extraction des composés phénoliques dans l'acétone	22
Figure 15 : Photographie de l'extrait sec	23
Figure 16: Taux d'humidité des feuilles des cinq plantes Alliées	28
Figure 17:Rendement d'extraction des feuilles des cinq plantes Alliées	29
Figure 18 : Les teneurs en polyphénols totaux des extraits méthanoliques et acétoniques des feuilles des plantes étudiées	30
Figure 19 : Les teneurs en Flavonoïdes totaux des feuilles des plantes.....	32
Figure 20 : Les teneurs en proanthocyanidines des extraits méthanoliques et acétoniques des feuilles des plantes étudiées	33
Figure 21 : Graphe du pouvoir réducteur en fonction des concentrations des extraits des plantes.....	34
Figure 22 :Pouvoir réducteur des feuilles des cinq plantes Alliées.	35
Figure 23 : Corrélations entre le pouvoir réducteur des extraits des plantes et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c).....	34
Figure 24: Activité « scavenger » de radical libre DPPH des extraits des plantes.	37
Figure 25 : Corrélations entre l'activité antiradicalaire (DPPH) des extraits des plantes et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c).	39
Figure 26 : Effet «scavenger» des extraits des plantes sur le H ₂ O ₂	40
Figure27 : Corrélations de l'effet scavenger sur le H ₂ O ₂ et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c).	41

INTRODUCTION

Introduction

Originaires de l'Asie centrale, les Alliées sont des plantes aromatiques cultivées dans le monde entier depuis des millénaires. Cette famille de plantes inclut environ 500 espèces, dont l'oignon (*Allium cepa*), l'ail (*Allium sativum*), l'échalote (*Allium ascalonicum*) et le poireau (*Allium porrum*). Elles sont consommées depuis plus de 4 000 ans pour leurs qualités aromatiques ainsi que pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé. Les études épidémiologiques, essentiellement des études cas-témoins, suggèrent fortement une réduction du risque de cancers, en particulier les cancers de la sphère digestive, chez les populations consommant de grandes quantités d'Alliées. De nombreuses études de cancérogenèse expérimentale menées chez l'animal confortent ces observations. Elles montrent que divers extraits d'ail ou d'oignon, ainsi que plusieurs composés organosoufrés issus de ces végétaux, ont la capacité de ralentir, voire de bloquer, différentes phases de la cancérogenèse chimique (Le Bon, 2016).

Les espèces d'*Allium* comestibles sont les principales cultures maraîchères à l'échelle mondiale (Vu *et al.*, 2013), et sont utilisées pour leurs propriétés médicinales empiriques et leurs propriétés culinaires. Une des originalités majeures des plantes médicinales réside dans leur capacité à produire des substances naturelles très diversifiées. En effet, à côté des métabolites primaires classiques (glucides, protéides, lipides), ils accumulent fréquemment des métabolites dits secondaires. (Marcheix *et al.*, 2005). Ces constituants sont moins toxiques et facilement biodégradables (Fawcett and Spencer, 1970), réputés depuis l'Antiquité pour leurs propriétés pharmacologiques, et leurs activités biologiques. Ces dernières années, l'intérêt porté aux antioxydants naturels, en relation avec leurs propriétés thérapeutiques a augmenté considérablement. Des diverses recherches ont été développées pour l'extraction, l'identification et la quantification de ces composés à partir de plusieurs substances naturelles à savoir les plantes médicinales et les produits agroalimentaire (Le Bon, 2016).

Dans notre pays la flore sauvage et cultivés est très diversifiée et largement utilisés en alimentation et médecine traditionnelle. Plusieurs chercheurs s'intéressent à l'activité biologique et la caractérisation chimique de ces plantes. Dans ce contexte nous nous sommes intéressés à l'étude des plantes cultivées et sauvage de la riche flore de la région de Tizi-Ouzou et Bejaia, et ce dans le but de l'évaluation de l'activité antioxydante des feuilles de certaines plantes *Alliées*.

SYNTHESE

BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE I

Les plantes sont d'une importance capitale pour la survie de l'homme et des différents écosystèmes. Une des originalités majeures des végétaux réside dans leur capacité à produire des substances naturelles très diversifiées. En effet, à côté des métabolites primaires classiques qui sont apportés à la plante par la photosynthèse et la nutrition, ils accumulent fréquemment des métabolites dites « secondaires » dont la fonction physiologique n'est pas toujours évidente mais qui représentent une source importante de molécules utilisables par l'homme dans des domaines aussi différents que la pharmacologie ou l'agroalimentaire (Bruneton, 2009a; Macheix *et al.*, 2005)

Métabolites primaires : sont des molécules organiques qui se trouvent dans toutes les cellules de l'organisme d'une plante pour y assurer sa survie. Ces composés sont classés en quatre principaux groupes, les glucides, les protéines, les lipides et les acides nucléiques (Goetz *et al.*, 2009).

- **Métabolites secondaires :** sont des substances chimiques appelés principes actifs élaborée par la plante, qui vont lui permettre de lutter contre toutes les agressions environnementales (Bruneton, 2009a; Macheix *et al.*, 2005).

Les métabolites secondaires appartiennent à des groupes chimiques variés (alcaloïdes, terpènes, composés phénoliques....), avec une répartition très inégale selon les végétaux, quelque fois entre des espèces très voisines ou même entre différentes sous-espèces ou variétés à l'intérieur d'une même espèce (Macheix *et al.*, 2005). (Bruneton, 2009a; Macheix *et al.*, 2005)

I. Composés phénoliques :

Les composés phénoliques interviennent dans la prévention et le traitement des maladies, avec plus de 8000 structures phénoliques connues, ils constituent l'une des grandes familles de molécules largement répandues dans le règne végétal (Beta *et al.*, 2005). Ils regroupent un vaste ensemble de substances chimiques comprenant au moins un noyau aromatique et un ou plusieurs groupements hydroxyles et sont le produit du métabolisme secondaire des plantes (Bruneton, 2009b). Selon le nombre d'unités phénoliques présentes, on les classe en phénols simples, les acides phénoliques, les flavonoïdes, les tanins hydrolysables et condensés, les coumarines, les lignines et les xanthones (Stalikas, 2007).

I.1. Biosynthèse des composés phénoliques :

L'origine biosynthétique des composés phénoliques des végétaux est proche, tous dérivant de la l'acide shikimique (**Figure 1**). Cette voie shikimate conduit à la formation des oses aux acides aminés aromatiques (phénylalanine et tyrosine) puis par désamination de ces

derniers, aux acides cinnamiques et à leurs très nombreux dérivés : acide benzoïques, acétophénonnes, lignanes et lignines, coumarines (Bruneton, 1993).

Figure 1 : Biosynthèse des composés phénoliques le plus largement distribués par la voie de shikimate (Crozier *et al.*, 2008). **PAL** : phénylalanine ammonia-lyase ; **C4H** : cinnamate 4-hydroxylase.

I.2. Phénols simples et les acides phénoliques :

Les phénols simples sont les composés renfermant une ou plusieurs unités phénoliques sans d'autre fonction particulière impliquant le(s) noyau(x) benzénique(s) comme le 3-hydroxytyrosol, le tyrosol, le 4-vinylphénol. Les acides phénoliques sont les dérivés hydroxylés de l'acide benzoïque et de l'acide cinnamique (Koné, 2009).

I.3. Flavonoïdes :

Les flavonoïdes représentent une classe de métabolites secondaires largement répandus dans le règne végétal. Ce sont des pigments quasiment universels des végétaux qui sont, en partie, responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles. On les trouve dissous dans la vacuole des cellules à l'état d'hétérosides ou comme constituants de plastes particuliers, les chromo plastes (Guignard, 1996).

La structure de base de flavonoïde est le noyau flavane, qui se compose de 15 atomes de carbone disposés en trois cycles (C6-C3-C6) qui sont nommés cycle A, cycle B et cycle C (Stalikas, 2007). En basant sur leur squelette, les flavonoïdes peuvent être divisés en différentes classes : anthocyanidines; flavonoles ; isoflavonoles ; flavones ; isoflavones ;

flavanes ; isoflavanes ; flavanols ; isoflavanols ; flavanones ; isoflavanones ; aurones (Edenharder and Grünhage, 2003; Guignard, 1996; Havsteen, 2002).

Figure 2 : Structure générale des flavonoïdes (Yao *et al.*, 2004).

I.4. Tanins :

Cette classe désigne le nom général descriptif du groupe des substances phénoliques polymériques, ayant une masse moléculaire comprise entre 500 et 3000 qui présente, à côté des réactions classiques des phénols, la propriété de précipiter les alcaloïdes, la gélatine et d'autres protéines (Cowan, 1999; Guignard, 1996; Haslam, 1996).

Les tanins sont caractérisés par une saveur astringente et sont trouvés dans toutes les parties de la plante : l'écorce, le bois, les feuilles, les fruits et les racines (Guignard, 1996; Scalbert, 1991).

I.4.1. Tanins hydrolysables : qui sont des oligo ou des polyesters d'un sucre et d'un nombre variable d'acide phénol. Le sucre est très généralement le D-glucose et l'acide phénol est soit l'acide gallique dans le cas des gallotannins soit l'acide ellagique dans le cas des tanins classiquement dénommés ellagitannins (Bruneton, 1999; Cowan, 1999).

Figure 3 : Structure chimique des acides gallique (A) et ellagique (B)

I.4.2 Tannins condensés ou tannins catechiques ou proanthocyanidols : qui se différencient fondamentalement des tannins hydrolysables car ils ne possèdent pas de sucre dans leur molécule et leur structure est voisine de celle des flavonoïdes. Il s'agit des polymères flavaniques constitués d'unités de flavan-3-ols liées entre elles par des liaisons carbone.

Les proanthocyanidols ont été isolés ou identifiés dans tous les groupes végétaux, Gymnospermes et Fougères (Bruneton, 1999; Cowan, 1999).

I.5. Coumarines :

Les coumarines qui sont aussi les dérivés de C6-C3, appartiennent au groupe des composés connus par des benzo- α -pyrone et toutes sont substituées en 7 par un hydroxyle. Elles se trouvent dans la nature soit à l'état libre ou bien combiné avec des sucres (Cowan, 1999; O'Kennedy and Zhorenes, 1997).

I.6. Quinones :

Ce sont des composés oxygénés qui correspondent à l'oxydation de dérivés aromatiques avec deux substitutions cétoniques. Elles sont caractérisées par un motif 1,4-dicéto cyclohexa-2,5-diéniq (para-quinones) ou, éventuellement, par un motif 1,2-dicéto cyclohexa-3,5 diéniq (ortho-quinones) (Bruneton, 1993). Elles sont ubiquitaires dans la nature, principalement dans le règne végétal et sont fortement réactifs (Cowan, 1999).

I.7. Lignines et Lignanes :

Ce sont des composés dont la formation implique la condensation d'unités phénylpropaniques (C6-C3). Leur distribution botanique est large, plusieurs centaines de composés ont été isolés dans environ soixante dix familles.

Les lignines s'accumulent au niveau des parois des cellules. Elles sont présentes au niveau des vaisseaux conduisant la sève brute et sont responsables de la rigidité des fibres végétales. On les trouve également dans les tissus végétaux présentant une forte résistance mécanique, comme les sclérenchymes des chaumes ou le noyau des fruits, il résulte de la polymérisation tridimensionnelle de trois molécules phénoliques de base appelées monolignols alcool coumarilique, coniférylique et sinapylique (Boutefas, 2011; Macheix *et al.*, 2005).

II. Propriétés biologiques des composés phénoliques :

Les recherches récentes sur les composés phénoliques en générale et les flavonoïdes en particulier sont très poussées en raison de leurs diverses propriétés physiologiques comme les activités antiallergique, anti-athérogénique, anti-inflammatoire, hépatoprotective,

antivirale, antibactérienne, anticarcinogénique, anti-thrombotique et cardioprotective (Ksouri *et al.*, 2007; Middleton *et al.*, 2000). Ces actions sont attribuées à leur effet antioxydant qui est due à leurs propriétés redox en jouant un rôle important dans la destruction oxydative par la neutralisation des radicaux libres, piégeage de l'oxygène, ou décomposition des peroxydes (Nijveldt *et al.*, 2001). En effet, les antioxydants sont définis par Halliwell (1996) comme toutes substance qui en faible concentration par rapport au substrat susceptible d'être oxydé prévient ou ralentit l'oxydation de ce substrat (Pastre and Priymenko, 2007).

Les radicaux libres qui sont des molécules instables, réagissent avec d'autres molécules, les déstabilisent à leurs tours, et induisent ainsi des réactions en chaînes (Goudable and Favier, 1997; Halliwell, 1996; Halliwell, 2011). Les radicaux libres provoquent notamment des dommages sur l'ADN, les protéines et les lipides membranaires (Menvielle-Bourg, 2005). Les dommages provoqués par ces derniers sont à l'origine de nombreuses maladies telles que: le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les dysfonctionnements du cerveau (Bidié *et al.*, 2011; Fusco *et al.*, 2007; Sies *et al.*, 1992).

CHAPITRE II

CHAPITRE II

III.1 Définition et caractéristiques de la famille des Alliées

Les *Alliées* forment une grande famille de plantes monocotylédones; souvent bulbeuses, parfois tubéreuses; ayant généralement des fleurs supères en ombelle, à 6 étamines. Le fruit est une capsule ou une baie. Elle englobe 600 espèces réparties en 30 genres riches en composés soufrés volatils, leur donnant une odeur caractéristique (Dugravot, 2004).

La famille des *Alliées* est largement distribuée dans les régions tempérées à tropicales; communes dans les habitats semi-arides (Judd *et al.*, 2002).

Le genre *Allium* est le plus grand et le plus important représentant de la famille des Alliées. Les espèces du genre *Allium* sont largement répandues dans les régions qui ont une saison sèche (Hirschegger *et al.*, 2010). Outre l'ail et l'oignon qui sont les espèces les mieux connues, plusieurs autres espèces sont largement cultivées pour usage culinaire, comme le poireau (*Allium porrum* L.), la ciboule (*Allium fistulosum* L.), l'échalote (*Allium scaberrimum* Hort.), l'ail des ours (*Allium ursinum* L.), l'ail éléphant (*Allium ampeloprasum* L.), la ciboulette (*Allium schoenoprasum*) et la ciboulette chinoise (*Allium tuberosum* L.) (Lanzotti, 2006).

Auparavant, le genre *Allium* faisait partie de la famille des Liliaceae et plusieurs botanistes le rangent encore dans cette famille, mais d'après l'APG III (2009) de nombreux botanistes rangent ce genre dans la famille des Alliaceae (Timite, 2012).

Les composés soufrés sont les plus abondants et les mieux connus des composés secondaires des *Allium*, qui synthétisent également d'autres composés secondaires comme des saponines (Kawashima *et al.*, 1993).

La plupart des activités biologiques liées aux *Allium* sont cependant dues à des substances volatiles dérivées de ses acides aminés. Celles-ci sont émises lors de la destruction des cellules. Les acides aminés précurseurs sont alors mis en présence d'une enzyme, l'alliinase ou alliinase, qui provoque, après la coupure de la liaison C-S, la synthèse de toute une série de composés soufrés volatils et non volatils et des composés non soufrés volatils et non volatils et des composés non soufrés (Najjaa *et al.*, 2011).

De leur côté, (Mazza and Oomah (2000) affirment la présence des stérols et des glycosides stéroïdaux dans diverses espèces d'*Allium*, surtout dans les bulbes et les feuilles d'oignon. Ces auteurs ont signalé que la concentration des saponines est de 0,1% dans le poireau, 0,021% dans l'ail et 0,095% dans l'oignon.

III.1.1 *Allium sativum* (l'ail):

III.1.1.1. Origine:

Indigène de Sibérie, l'ail a conquis l'Europe via l'Orient. C'est l'une des plus anciennes cultures à laquelle maints documents chinois, égyptiens, grecs ou romains ont fait allusion. Au Mexique, l'ail se vendait déjà lorsque Cortès envahit le pays en 1519 (Boullard, 2001). De nos jours, il est cultivé partout dans le monde pour des usages culinaires.

III.1.1.2. Classification de l'espèce *Allium sativum*.L :

Règne: Plantae. **Sous-règne :** Tracheobionta.

Embranchement : Magnoliophyta.

Sous-embranchement : Magnoliophytina.

Classe : Liliopsida.

Sous-classe : Liliidae.

Ordre : Liliales : (Asparagales).

Famille : Alliaceae (ex Liliaceae).

Genre : *Allium*.

Espèce: *Allium sativum* L (Goetz and al, 2012).

Figure 4 : *Allium sativum* (l'ail) (Goetz and al, 2012) A ; les feuilles, B ; inflorescence, C ; bulbe d'ail, D ; les gousses d'ail.

III.1.1.3. Appellation vernaculaire: On l'appelle en :

Français: Ail commun, ail cultivé, thériaque des pauvres ;

Allemand: Knoblauch, knobloch, krob, knoblichknofel, kofel, knuffloch, windwurz, weingartenknoblauch ; ang : garlic, common garlic.

Espagnol : Ajo, ajocomun, ajovulgar.

Italien : Aglio, agliocomune.

Arabe : Thoum, (Goetz and Ghedira, 2012; Teuscher et al., 2005).

III.1.1.4. Description :

Herbacée pouvant atteindre 25 à 90 cm de haut et dont la tige est courbée avant la floraison ; elle est vivace par son bulbe formé d'un assemblage de petits bulbes ou caïeux, qui sont ovales et allongés ou arrondies. Ces caïeux sont comprimés les uns contre les autres, l'ensemble étant enveloppé dans une mince tunique membraneuse, de couleur variable (blanchâtre, verdâtre, rosée, pourpre, violette).

Les fleurs sont formées de 6 sépales pétaloïdes, blanc rosé ou verdâtre, et de 6 étamines. Les anthères sont fixés dorsalement et les filets élargis à la base. Les fleurs sont généralement stériles (sauf quelques formes asiatiques) (Fenwick et al., 1985).

III.1.1.5. Culture :

L'ail préfère les sols argileux, profonds, riche en humus et en nutriments, ensoleillés, une plante supportant l'hiver rude. L'ail ne doit pas être cultivé dans le même terrain plusieurs années de suite : une périodicité d'au minimum 5ans. Se multiplie par voie végétale grâce à ces caïeux et bulbilles, planté en septembre et à mi octobre pour les variétés d'hiver (Bogin *et al.*, 1984).

III.1.1.6. Constituants bioactifs de *Allium sativum*.L:

L'ail renferme notamment des composés soufrés (teneur variable selon le cultivar, l'origine géographique, l'époque de la récolte (Goetz and Ghedira, 2012).

Il contient quatre constituants – la 5-allylcystéine, la 5-allylmercaptocystéine, l'alliine et l'allicine – possédant des propriétés antioxydantes démontrées par des testes *in vivo* (Pinto *et al.*, 2006; Tattelman, 2005).

Outre les composés organosoufrés, l'ail contient des glucosides stéroïdiens, des lectines, des prostaglandines, des fructanes, des pectines, une huile essentielle, des vitamines (B1, B2, B6, E), de la biotine, de l'acide nicotinique, des acides gras, des glycolipides, des phospholipides, des anthocyanosides, des flavonoïdes, des acides aminés essentiels (Goetz and Ghedira, 2012).

III.1.1.7. Effets bénéfiques de l'ail :

L'ail a la réputation d'être antiseptique, hypotenseur, hypoglycémiant, anti-rhumatismal, antihelminthiasique, antimalarien, coricide, balsamique, rubéfiant carminatif. Il est communément utilisé en médecine populaire pour faciliter la circulation, équilibrer la pression artérielle, stimuler le cœur et corriger une dyslipidémie (Pinto *et al.*, 2006; Tattelman, 2005).

III.1.2. *Allium porrum* (poireau) :**III.1.2.1. Origine :**

Originaire d'Asie centrale, il est inconnu à l'état sauvage probablement originaire de l'est du bassin méditerranéen est vraisemblablement issu de l'espèce *A. ampeloprasum* appelée également « poireau d'été » ou « ail des cheveux » (Couplan, 1998; Samaranyake *et al.*, 2000).

III.1.2.2. Classification de l'espèce *Allium porrum* :

Famille: Alliaceae.

Espèce : *Allium porrum* L.var.*porrum*.

Synonyme : *Allium ampeloprasum*. Var. *porrum* J.GA.

III.1.2.3.Appellation vernaculaire :

Français : poireau sauvage, poireau des vignes, poireau perpétuel.

Kabyle : el porro.

Allemand: porree, lauch, breittauchspaischerlauch, welsch, zwiebe.

Anglais: leek, com non leek, purret.

Figure 5: Photographie
Allium porrum

III.1.2.4. Description :

Le poireau est une plante vivace à tige cylindrique épaisse en partie recouverte de feuilles engainantes, pliées en deux, d'un vert bleuté, elles diffèrent par la taille, la teinte des feuilles, la précocité, etc (Couplan, 1998).

Elles sont allongées à lancéolées en formes de bandes ou rubans parcourus par de longues nervures parallèles, à limbe unifacial de 0.5 à 1m de long sur 3 à 5cm de large et forment à la base une sorte de tronc cylindrique (appelé fût) sur environ 25cm de hauteur, de couleur blanche car il reste enterré. Le pied se termine par un bulbe peu développé, parfois par des bulbes secondaires.

L'inflorescence est formée d'une grande ombelle multiflore, portant une seule bractée membraneuse enflée de façon convexe et pourvue d'une longue extrémité pointue. Les fleurs comportent un périanthe (3sépale +3pétales), pourpre claire à blanchâtre et rayé de vert ou de rose, 6étamines et un ovaire tri-carpellaire.

Le fruit est une capsule à 3côtés et divisé en 3 loges chacun d'entre elles renfermant 1à2 graines(Dion et al., 1997; Fenwick et al., 1985).

L'espèce *Allium porrum* .L, Se subdivise en deux variétés :

*A .porrum*L.Var. *porrum* et

*A. porrum*L.Var.*sectivum* F(Fenwick et al., 1985).

III.1.2.5. Culture :

Le poireau nécessite des sols profonds, humides, riche en humus et en nutriments, situés dans des endroits ensoleillés ou semis ombragés.

Le poireau d'été semé en janvier dans des pots de culture placés à 16 ou 20°C. Les jeunes pousses sont repiquées à partir d'avril en plain champ ou en terre, celui d'automne est semé

en mars ou avril puis est repiqué en mai ou juin, et la variété d'hiver n'est semée que la fin mai, directement sur place protégé sous des couches (des grands froids).

De nombreuses variétés potagères existent pour le poireau d'été « Alma » et « Ekkechard » ; pour le poireau d'automne : « Bavaria », « balaugrinerher best » avec de nombreuses races comme: Genia, janos, Kampus, Metkeretpanchoet pour le poireau d'hiver « blaugrunerwinter » de races pollux et poros (Schreyen *et al.*, 1976).

III.1.2.6. Constituants bioactifs de l'espèce *Allium porrum*:

Les constituants représentant l'odeur du poireau sont des alcényl-oligosulfides, avec en outre méthylpente-2-énal, de l'ex-2-énal et du propane thiolces. Ces constituants sont étroitement liés à la fois quantitativement et qualitativement aux variétés et aux origines cultivées (Noleau *et al.*, 1991).

Les flavonoïdes caractérisés dans le poireau sont : isoquercitine (quercétine-2-glucoside et estragaline kaempférol-3-glucoside (Starke and Herrmann, 1976).

Les sucres retrouvés sont des polyoligo et monosaccharides (18%), des polyhydrosolubles (10 à 15%), des fructanes, arabanes, et actines à l'origine de la formation de mucilage (Darbyshire and Henry, 1981; Rubat du Merac, 1949).

III.1.2.7. Effets bénéfiques du poireau:

Le poireau est peu nutritif dans son ensemble, mais il faut noter une différence importante entre le blanc de poireau plus tendre, plus aqueux, dépourvu de chlorophylle, et le vert des feuilles nettement plus riche en nutriments (Couplan, 1998). Le poireau est traditionnellement utilisé pour traiter les vers intestinaux et pour ses vertus diurétiques (Koch, 1996).

III.1.3. *Allium ascalonicum* (l'échalote):

III.1.3.1. Origine:

Originnaire d'Asie centrale, il a été trouvé à l'état sauvage en Asie mineure et en orient. L'échalote (*allium ascalonicum*) est utilisée en orient depuis le moyen âge : elle s'est fait connaître après la destruction de la ville israélite d'askalon vers 1192 et 1270, d'où son appellation vernaculaire d'ail d'Ascalon, au XII^{ème} siècle, elle est parvenue en Europe grâce aux croisés (Prasad *et al.*, 1997)

III.1.3.2. Classification de l'espèce *Allium ascalonicum* :**Règne :** plantae.**Classe :** Liliopsida.**Ordre :** Liliales**Famille :** Alliaceae.**Genre :** *Allium***Espèce :** *Allium cepa* L. var. *ascalonicum* Baker synonymeauct. non L (Fenwick et al., 1985; Mochizuki *et al.*, 1996)

Figure 6: Photographie *Allium ascalonicum*

III.1.3.3. Appellation vernaculaire :**Français:** Ail stérile, chalote, ail d'Ascalon**Allemand :** Schalote, charlotte, Aschalauch, ... etc.**Anglais:** Shallot (parfois décrit comme l'oignon d'hiver (Couplan, 1998).**III.1.3.4. Description :**

Plante herbacée vivace qui atteint 0.2 à 1m de hauteur. Le bulbe isolé d'échalote est constitué d'un plateau sur lequel sont insérés des bourgeons, des bases foliaires et écailles charnus, le tout protégé par des tuniques sèches. La forme du bulbe varie selon le type d'échalote.

Le bourgeon est entouré de plusieurs feuilles réduites à leur gaine, insérées en spirale sur le plateau ; la moitié d'entre elles deviendront vertes et fistuleuses et leur disposition simulera une tige ; les 3 à 4 feuilles centrales ont des bases épaisses par l'accumulation des réserves. Les feuilles de l'échalote sont dressées, entières, cylindriques tubuleuses gorgés d'eau glabres, plus minces à leur base ainsi qu'à leur extrémité pour celle qui ne porte pas d'inflorescences. Celle-ci est une ombelle sphérique entourée d'une spathe à 3 valves faiblement acuminées, repoussé en arrière à la floraison.

Cette floraison est située à l'extrémité d'une hampe florale qui présente sur son tiers inférieur un renflement localisé, caractéristique. Les fleurs sont bleutées, blanchâtres ou roses, et comprennent 3 sépales pétaloïdes et 3 pétales étroits et pourvus d'une ligne médiane rouge, pourpre foncé, le fruit est une petite capsule sphérique poricide qui renferme des graines triangulaires. La floraison a lieu de Juin à Juillet. (Fenwick *et al.*, 1985; Mochizuki *et al.*, 1996).

III.1.3.5. Culture :

L'échalote aime les sols riches en humus, les endroits ensoleillés et chauds, elle doit être bien arrosée et binée superficiellement.

Sa multiplication se fait en mars ou en avril par semis d'environ 1cm de profondeur et sur des rangs espacés d'environ 20cm. Lorsque les jeunes pousses ont environ 15cm de hauteur, elles sont repiquées et disposées en petites touffes espacées de 15 à 20cm.

Les bulbes sont placés verticalement et enterrés sur un tiers de leur hauteur. A partir du bulbe « mère » se développe rapidement une touffe formée de plusieurs petits bulbes « fils » (Samaranayake *et al.*, 2000).

III.1.3.6. Constituants bioactifs de l'espèce *Allium ascalonicum*:

Présence de dérivés soufrés qui après rupture des tissus, ils sont dégradés par l'alliinase, qui dégrade l'alliine en composés soufrés les acides alkénylsulfonates responsables de l'odeur alliée caractéristique de l'échalote (Block *et al.*, 1992). Au chauffage d'autres composés se forment responsables de la saveur exemple le trisulfure de méthyle, le dipropyl et le diméthyle, le disulfure de dipropyl, le diméthyltiopéne (Michahelles, 1974)

Les flavonoïdes : hétérosides de quercétine par exemple la spiraeoside, l'isoquercétine (Brandwein, 1965; Fleischauer *et al.*, 2000).

Sucres : saccharose environ 4%, fructose 30 à 65% (Rubat du Merac, 1949).

III.1.4. *Allium triquetrum* (Bibras) :

III.1.4.1. Origine :

L'ail à tige triquète (*Allium triquetrum* L.) appartient à la famille des liliacées et au même genre que l'ail servant à faire la cuisine c'est une espèce d'origine méditerranéenne qui a été introduite en Bretagne mais aussi en Angleterre pour des motifs ornementaux et culinaires.

En Algérie, il est surtout commun au Tell et assez rare à l'ouest (Baba Aissa, 1999; Quézel and Santa, 1963).

III.1.4.2. Classification :

Règne : Plantes

Sous-embranchement : Angiospermes.

Classe : Monocotylédones.

Ordre : Asparagales.

Famille : Amaryllidacées.

Sous-famille : Allioidées.

Genre : *Allium*.

Espèce : *Allium triquetrum* L.

**Figure7: Photographie
*Allium triquetrum***

III.1.4.3.Appellation vernaculaires :

Anglais: Angled Onion, triangle onion, triangular stalked garlic, three- cornered leek, triquetrous garlic or leek, onion weed.

Français : Ail triquètre, ail à tige triquètre, ail à trois angles, ail campanulé, ail sauvage.

Arabe :Thoumelghaba (ail forestier), bassal edzib (oignon de chacal).

Kabyle :Bibras ou vivras. (Baba Aissa, 1999; Corea *et al.*, 2003).

III.1.4.4. Description :

Allium triquetrum (Bibras) est une plante vivace, herbacée d'une hauteur de 15-50centimètre qui varie en fonction de la provenance et des conditions environnementales. Le nombre de feuilles diffère et chaque plantes se compose généralement de 2-5 feuilles et de 1-3 tiges florifères par bulbe les feuilles sont larges de 5 à 15 millimètres, vertes planes, glabres lancéolées. Le pédoncule est un peu épais, triangulaire, dressé découlant directement du bulbe et le plus souvent plus long que les feuilles, il se termine par une ombelle contenant chacune 6-10 fleurs. Les bulbes et les bulbilles sont généralement ovoïdes, blanc-crèmes avec une odeur forte d'ail. Les fleurs d'*Allium triquetrum* sont campanulées (en clochette) et pendulaires (Garcia-Salas *et al.*, 2010).

III.1.4.5.Culture :

L'ail triquètre s'installe dans des friches sèches et préfère une exposition ensoleillée à semi ombragé. Le sol doit être limono-graveleux ou argileux sableux. Cette espèce est indicatrice de zones humides et elle supporte des températures jusqu'à 12°C.

Les graines germent à la première année et les bulbes seront formés à partir de la seconde année généralement, la période de la floraison a lieu entre les mois de mars et mai, mais elle peut être significativement modifiée par les conditions saisonnières et de la température après maturation des bourgeons.(Kodaira *et al.*, 2000).

III.1.4.6.Constituants bioactifs de l'espèce *Allium triquetrum* :

D'après les essais faits sur le dosage des composés phénoliques dans les extraits de feuilles et bulbes selon deux méthodes différentes d'extraction (chauffage par microonde et macération).

La variation de la teneur en PPT en fonction de la partie de la plante est significative, dont les feuilles donnent les teneurs les plus élevées (16,167 mg EAG/g PS en moyenne). Cette teneur est environ 5 fois supérieure à celle enregistrée par les bulbes (3,204 mg EAG/g PS en moyenne).

Les résultats sont supérieurs à ceux des travaux conduits par Bernaert *et al.* (2012) sur les 30 cultivars poireau indiquant les valeurs oscillant de 5 à 15,14 mg EAG/g PS et ceux de Bozin *et al.* (2008) rapportant une valeur de 0,18 mg EAG/g PS pour les bulbes d'ail étudiés.

Statistiquement la différence entre les teneurs en flavonoïdes et en flavonols est significative, les feuilles enregistrent, en moyenne, 14,231 et 13,563 mg EQ/g PS en flavonoïdes et flavonols respectivement ; tandis que les bulbes renferment des teneurs 9 à 12 fois plus faibles (1,456 et 1,066 mg EQ/g PS en flavonoïdes et flavonols, respectivement. Bozin *et al.* (2008), rapportent des résultats supérieurs aux antécédents concernant la teneur en flavonoïdes totaux des bulbes de l'ail (5,78 mg EQ/g PS).

les flavonols représentent la majeure partie des flavonoïdes totaux des différentes parties d'*Allium triquetrum. L.* étudiées.

En plus de ces composés bioactifs l'*A. triquetrum* contient ces précurseurs avec les proportions suivantes : 43 - 56 % de méthiine, 21 - 31 % d'alliine, 19 - 26 % d'isoalliine et 0 - 4 % de propiine (Fritsch and Keusgen, 2006).

III.1.5. *Allium ampeloprasum* (poireau sauvage ou terenesth) :

III.1.5.1. Classification de l'espèce *Allium ampeloprasum* :

Clade : Angiospermes.

Clade : Monocotyledones.

Ordre : Asparagales.

Famille : Amaryllidaceae.

Genre : *Allium*.

Espèce : *Allium polyanthum*. (Bock, 2014).

**Figures 8:
Photographie Allium**

III.1.5.2. Appellation vernaculaire :

Français: poireau sauvage, poireau des vignes, poireau perpétuel.

Kabyle : terenasth.

Italien: Agliopolianto.

Espagnole: Ajopolianto

Anglais: Many-flowered Onion. (Bock, 2014).

III.1.5.3. Description:

C'est une plante vivace appartenant à la famille des Alliaceae genre *Allium* espèce *Allium polyanthum*, bulbeuses à bulbe tunique. Feuilles toutes basilaires ou quelques unescaulinaires. Tige florifère simple. Fleurs en cymes ombelliformes, enveloppées avant la

floraison dans une spathe membraneuse à 1-2 valves; se transformant parfois en bulbilles, Périanthe à 6 sépales soudés à la base, et Six étamines en 2 verticilles. Plante atteignant 2 m. Fleurs purpurines, blanchâtres ou verdâtres. Assez connu au: Secteur des Hauts-Plateaux, secteur de l'Atlas Saharien, et rare ailleurs. (Quézel and Santa, 1963).

III.1.5.4. Culture :

A partir des gros caïeux sessiles, *A. polyanthum* donne une plante très robuste, d'un calibre bien supérieur à celui observé dans la nature, surtout si on le protège de la rouille (*puccinia allii*) à la quelle il est très sensible. Les caïeux obtenus en culture sont de très forte taille. Les caïeux pédiculés, récoltés en juin, séchés, replantés en octobre ou novembre, ne germent pas on les retrouve intactes au printemps suivant. Il faut plusieurs années pour que leur tégument décompose dans le sol et que leur dormance s'élimine: c'est une forme de conservation de longue durée; la coexistence des deux types de caïeux, en l'absence de reproduction par graine, assure la permanence de cette espèce dans la nature (Messiaen, 1993).

III.1.5.5. Principaux constituants bioactifs des feuilles d'*A. ampeloprasum* :

Les résultats des études, effectuées sur les feuilles d'*A. ampeloprasum* ont montrés la présence de coumarines, de flavonoïdes, de saponosides, de tanins, de dérivés phénoliques, d'iridoïdes, de quinones libres, de stéroïdes et d'hétéroside (Dini *et al.*, 2005; Lachman *et al.*, 2003; Lanzotti, 2006; Morita *et al.*, 1988; Najjaa *et al.*, 2011).

**MATERIE
MATERIEL
ET
METHODES**

III.1. Préparation du matériel végétale

III.1.1. Récolte des plantes :

La récolte des cinq plantes (Echalote, Ail, Ail triquètre, Poireau, et Poireau sauvage) a été effectuée dans la région de la Kabylie. Le tableau I indique les lieux et périodes de récolte ainsi que les parties utilisées des plantes.

Tableau I : Lieux et périodes de récolte des différents échantillons.

Echantillons	Photo des échantillons	Lieu de récolte	Période de récolte	Parties utilisées
Echalote (<i>Allium ascalonicum</i>)		Bejaia	Mars 2018	Feuilles
Ail (<i>Allium sativum</i>)		Bejaia	Mars 2018	Feuilles
Ail triquètre (<i>Allium triquetrum</i>)		Tiz-ouzou	Mars 2018	Feuilles
Poireau (<i>Allium porum</i>)		Bejaia	Mars 2018	Feuilles
Poireau sauvage (<i>Ampyloprasum</i>)		Tizi-ouzou	Mars 2018	Feuilles

III.2. Détermination de la teneur en humidité :

III.2.1. Principe

On procède à une dessiccation de l'échantillon à analyser dans une étuve à la température de 105°C et sous la pression atmosphérique jusqu'à l'obtention d'une masse pratiquement constante. Pour éviter toute reprise d'humidité, il convient d'opérer dans des vases de tare, placés dans un dessiccateur (Abbassi *et al.*, 2005).

III.2.2. Mode opératoire :

Les feuilles des plantes ont été nettoyées et débarrassées de la poussière et d'autres impuretés. La teneur en humidité a été déterminée par dessiccation à l'étuve, 1g de l'échantillon est séchée dans des creusets à 105°C jusqu'à un poids constant. Les résultats sont exprimés en pourcentage selon la formule suivante :

$$TH \% = (P_f - P_s) / (P_f - P_c) * 100$$

TH (%) : Taux d'humidité en pourcentage.

Pc : La masse du creuset vide (g).

Pf : la masse du creuset avec l'échantillon avant le séchage.

Ps : La masse du creuset avec l'échantillon séché (g).

III.3. Préparations des échantillons :

Les feuilles des échantillons ont été séchées dans une étuve à une température de 40°C pendant 3 jours. Après séchage les feuilles sont réduites en poudre à l'aide d'un broyeur électrique puis tamisée afin d'obtenir une poudre de granulométrie homogène (250µm) (Figure 9). La poudre est conservée dans des récipients en verre à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Figure9 : Photographie de la poudre obtenue à partir des feuilles de l'ail.

III.4. Extraction :

L'extraction utilisée est de type solide-liquide, c'est-à-dire que le solvant doit franchir la barrière de l'interface solide-liquide et dissoudre le principe actif (les composés organiques) que la matrice végétale renferme à l'intérieur (Basli *et al.*, 2012).

Dans le but d'optimiser le solvant d'extraction des composés phénoliques totaux à partir des cinq plantes Alliées, deux solvants de différente polarité ont été utilisés l'acétone 70 % et le méthanol deux extraction avec 50% et la dernière extraction avec 80%. Une quantité de 5g est extraite trois fois avec 50ml de solvant, le mélange est soumis à une agitation à l'aide d'une plaque agitatrice (figure 10) à l'abri de la lumière et à une température ambiante. Après centrifugation et filtration avec un papier filtre (figure 11), les extraits liquides sont conservés à 4°C (voir figure 12) une autre partie a été évaporée pour avoir un extrait sec. Les protocoles d'extraction sont expliqués dans les figures 13 et 14.

Par la suite sont désignés comme extrait méthanolique et extrait acétonique les extraits obtenus selon les protocoles des figures 13 et 14 respectivement.

Figure 10 : Photographie de l'extraction sous agitation.

Figure 11: Photographie de la filtration.

Figure 12: Photographie de l'extrait liquide.

Figure13 : Extraction des composés phénoliques dans le méthanol.

Figure14 : Extraction des composés phénoliques dans l'acétone

III.5. Rendement d'extraction

Les solutions récupérées sont mises à l'étuve pour l'évaporation à 40°C jusqu'à l'évaporation totale du solvant (stabilisation du poids du bécher) (figure 15). L'extrait est récupéré puis pesé afin de calculer les taux d'extractions selon la formule suivante:

$$\text{Rendement d'extraction (g)} = [(P_1 - P_0) * 100] / 5$$

P_0 : poids de boîte vide en gramme.

P_1 : poids de boîte après évaporation en gramme

Ces extraits secs sont ensuite dissous dans les solvants (Méthanol, acétone) à des volumes connus pour donner des solutions mères qui sont ensuite conservées à 4°C.

Figure 15 : Photographie des l'extraits sec.

III.5. Dosage des polyphénols :

III.5.1. Dosage des polyphénols totaux :

5.1.1. Principe :

Le réactif est constitué par un mélange d'acide phosphotungstique (H₃PW₁₂O₄₀) et d'acide phosphomolybdique (H₃PMo₁₂O₄₀). Il est réduit, lors de l'oxydation des phénols, en un mélange d'oxydes bleus de tungstène (W₈O₂₃)(Ribereau-Gayon, 1968) et de molybdène (Mo₈O₂₃)La coloration produite, dont l'absorption maximum est comprise entre 725 et 750 nm est proportionnelle à la quantité de polyphénols présents dans les extraits végétaux (Bernaert et al., 2012).

5.1.2. Mode opératoire :

La teneur en polyphenols totaux a été déterminée par la méthode de Folin-Ciocalteu. 1 ml de réactif de Folin-Ciocalteu (dilué 10 fois) a été mélangé avec 100 µl de l'extrait des plantes. Après 5 min, 1 ml de solution aqueuse de carbonate de sodium (6%) a été ajouté. Le

mélange a été maintenu pendant 60 minutes à température ambiante. L'absorbance a été mesurée à 755 nm. Une solution éthanolique d'acide gallique a été utilisée comme standard.

Les concentrations en composé phénoliques des extraits sont exprimés en mg équivalent d'acide gallique (EAG)/100g de poudre sèche (PS).

III.5.2. Dosage des flavonoïdes :

5.2.1. Principe :

Le dosage des flavonoïdes est basé sur la formation de complexes suite à la chélation de métaux (Al^{3+}), utilisés sous forme de chlorure d'aluminium ($AlCl_3$), par les groupements OH. La coloration ainsi formée est proportionnelle au taux de flavonoïdes dans le mélange (Ribereau-Gayon, 1968)

5.2.2. Mode opératoire :

Les teneurs en flavonoïde ont été mesurées en utilisant une méthode colorimétrique modifiée. Une solution d'extrait a été ajoutée à un tube à essai contenant 1,25 ml d'eau distillée. Une solution de nitrite de sodium (5%, 0,075 ml) a été ajoutée au mélange et maintenue pendant 5 minutes. Ensuite, 0,15 ml de chlorure d'aluminium à 10% a été ajouté. Après 6 minutes, on ajoute finalement 0,5 ml d'hydroxyde de sodium 1 M. Le mélange a été dilué avec 0,275 ml d'eau distillée. L'absorbance du mélange à 510 nm a été mesurée immédiatement par rapport à une courbe standard préparée par la quercitrine. Les teneurs en flavonoïdes ont été exprimées en mg équivalent catéchine (EC)/ g poudre sèche (Zhishen *et al.*, 1999).

III.6.3. Dosage des proanthocyanidines :

6.3.1. Principe

La teneur en proanthocyanidines a été déterminée par la méthode du butanol HCl, c'est une méthode colorimétrique qui implique le clivage oxydatif des proanthocyanidines avec le sulfate ferreux, faisant apparaître une coloration rouge proportionnelle à la quantité des proanthocyanidines (Fawole *et al.*, 2012).

6.3.2. Mode opératoire :

La teneur en proanthocyanidines a été déterminée par le dosage du butanol HCl. A 0,5 ml d'extrait des plantes, on ajoute une portion de 5 ml d'une solution acide de sulfate ferreux (77 mg de $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ dissous dans 500 ml de HCl / n-butanol 2: 3). Les tubes sont couverts de

manière lâche et placés dans un bain Marie à 95 ° C pendant 15 minutes. L'absorbance est lue à 530 nm. La concentration en proanthocyanidines est exprimée en équivalents de cyanidine/100g de poudre sèche. Le coefficient d'extinction moléculaire (ϵ mol) qui peut être utilisé pour convertir les valeurs d'absorbance en une concentration est égal à 34700 L mol⁻¹cm⁻¹) (Fawole *et al.*, 2012).

III.7. Activité antioxydante :

III.7.1. Pouvoir réducteur :

7.1.1 Principe :

Le pouvoir réducteur se base sur la réaction d'oxydo/réduction. C'est l'aptitude des antioxydants présents dans l'extrait à réduire le fer ferrique (Fe³⁺) de complexe ferricyanure réduite qui donne une couleur verte qui est proportionnelle au pouvoir réducteur de l'extrait (Ribeiro *et al.*, 2008).

7.1.2. Mode opératoire :

Le pouvoir réducteur des extraits a été déterminé selon la méthode rapportée par Liu *et al.* (2008). Une solution d'extrait (2 ml), du tampon phosphate (2 ml, 0,2 M, pH 6,6) et du ferricyanure de potassium (2 ml, 10 mg / ml) ont été mélangés, puis incubés à 50 ° C pendant 20 minutes. De l'acide trichloracétique (2 ml, 100 mg / ml) a été ajouté au mélange. Un volume de 2 ml de chacun des mélanges ci-dessus a été mélangé avec 2 ml d'eau distillée et 0,4 ml de chlorure ferrique à 0,1% (p / v) dans un tube à essai. Après une réaction de 10 minutes, l'absorbance a été mesurée à 700 nm. L'augmentation de l'absorbance du mélange réactionnel indique un pouvoir réducteur élevé (Liu *et al.*, 2008).

III.7.2. Détermination de l'activité antiradicalaire (DPPH) :

7.2.1. Principe :

Le test DPPH est une méthode largement utilisée dans l'analyse de l'activité antioxydante. En effet, le radical DPPH (forme oxydée) se caractérise par sa capacité à produire des radicaux libres stables. Cette stabilité est due à la délocalisation des électrons libres au sein de la molécule. La présence de ces radicaux DPPH• donne lieu à une coloration violette foncée de la solution, qui absorbe aux environs de 515 nm. La réduction des radicaux DPPH• par un agent antioxydant entraîne une décoloration de la solution (forme réduite) (Molyneux, 2004).

7.2.2. Mode opératoire :

L'activité de piégeage des radicaux libres des extraits était mesurée par 1,1-diphényl-2-picryl-hydrazil (DPPH) comme décrit par Yang *et al.* (2006). Solution de DPPH à été préparé dans le méthanol (0,2mM), 2 ml de cette solution a été ajouté à 200µl d'extrait des plantes et a été laissé à température ambiante et à l'abri de la lumière pendant 30 minutes, puis l'absorbance a été lue à 517 nm contre le blanc. (Yang *et al.*, 2006).

L'activité antioxydant à été calculée en pourcentage de décoloration de DPPH en utilisant l'équation suivante :

$$AA\% = [(Abs_C - Abs_E) / Abs_C] * 100$$

AA% : Activité antioxydant.

Abs_C : Absorbance de contrôle.

Abs_E : Absorbance de l'échantillon.

III7.3. Teste «scavenger» sur l'H₂O₂ (peroxyde d'hydrogène) :

7.3.1 Principe :

Les polyphénols participent à la formation de deux molécules d'eau à partir de l'H₂O₂ et cela en lui cédant deux protons et deux électrons. L'absorbance est proportionnelle à la quantité d'H₂O₂ présente dans la solution. De ce faite l'absorbance diminue en fonction de l'effet «scavenger» sur le H₂O₂ des polyphénols présent dans les extraits (Gutteridge, 1995).

7.3.2. Mode opératoire :

Le piégeage de H₂O₂ a été déterminé par la méthode de (Ruch *et al.*, 1989). 1 Un volume de 0,6 mL de solution de 4 mmol / L H₂O₂ (en solution tampon phosphate [PBS]) a été ajouté à une solution de 4 ml de CPE et incubé pendant 10 minutes. L'absorbance de la solution a été mesurée à 230 nm contre une solution à blanc contenant le CPE sans H₂O₂.

Les pourcentages de la réduction d'H₂O₂ par l'extrait des plantes sont calculés comme suit :

$$\% [H_2O_2] = [(AT - AE) / AT] \times 100$$

Abst: Absorbance du témoin.

Abse: Absorbance de l'extrait.

III.8. Analyse statistique :

Une étude statistique a été faite par l'analyse de la variance (ANOVA) à un facteur pour les différents dosages pour les feuilles et les résultats des activités antioxydants avec le logiciel (STATISTICA 5.5), et cela pour la comparaison de ces résultats et la mise en évidence ses différences significatives entre les échantillons.

**RESULTATS
ET
DISCUSSION**

V.1. Taux d'humidité :

Les taux d'humidité (TH%) des cinq plantes sont calculés et rapportés sur les histogrammes ci-dessous.

Figure 16: Taux d'humidité des feuilles des cinq plantes Alliées.

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; $a > b > c > d$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

Les résultats du taux d'humidité de la présente étude montre que l'ail triquetre possède un taux d'humidité significativement plus élevé avec $95.85 \pm 0.987\%$ suivi de l'échalote $91.96 \pm 0.062\%$, ail $88.33 \pm 9.712\%$, poireau sauvage $87.84 \pm 0.757\%$ et poireau avec $85.7 \pm 9.270\%$.

V.2. Rendement d'extraction :

La solubilité des composés phénoliques dépend de leur nature chimique dans la plante, qui varie de composés simples à fortement polymérisés. Cette diversité structurale est responsable de la grande variabilité des propriétés physico-chimiques influençant l'extraction des polyphénols. Entre autre, la solubilité des composés phénoliques est affectée par la polarité du solvant utilisé (Mahmoudi *et al.*, 2013).

Les résultats enregistrés dans la figure 17 montrent que les rendements d'extractions des plantes varient de 29.8 à 50.4% pour les extraits acétoniques. La valeur la plus élevée est observée pour l'échalote ($50.4 \pm 0.89\%$) suivie d'Ail triquètre ($34.4 \pm 2.45\%$), Ail ($34 \pm 1.34\%$), poireau ($31 \pm 2.8\%$) et poireau sauvage avec un taux ($29.8 \pm 1.5\%$). Ces différences en taux d'extraction peuvent être influencées notamment par la composition chimique des plantes (Nawaz *et al.*, 2006). Par contre les extraits méthanoliques montre que la valeur la plus élevée est celle de l'échalote ($54.4 \pm 1.45\%$) suivie de poireau ($42.4 \pm 2.4\%$), Ail triquètre (36 ± 2.02) poireau sauvage ($32.4 \pm 2.02\%$) et l'ail ($27.8 \pm 1.65\%$).

L'étude statistique montre que le rendement d'extraction des différents extraits a présenté une différence significative ($p < 0.05$), à l'exception d'ail triquètre acétone et méthanol la différence n'est pas significative.

Figure 17: Rendement d'extraction des feuilles des cinq plantes Alliées.

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; $a > b > c > d > e > f$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

V.3. Teneurs des antioxydants :

V.3.1. Teneurs des polyphénols totaux :

L'objectif de l'étape d'extraction des composés phénoliques à partir de la matrice végétale est de libérer ses composés à partir des structures vacuolaires, où ils se trouvent par la rupture du tissu végétal ou par le phénomène de diffusion.

Les résultats du dosage des polyphénols totaux obtenus pour les extraits méthanoliques et acétoniques des feuilles des différentes plantes sont exprimés en mg équivalent d'acide gallique par 100 g de poudre sèche (mg EAG/100g PS). Les teneurs sont présentées dans la (figure 18).

Figure18: Les teneurs en polyphénols totaux des extraits méthanoliques et acétoniques des feuilles des plantes étudiées

. Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; $a > b > c > d > e > f > g > h > i$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

L'étude statistique montre que les teneurs en polyphénole totaux des différents extraits ont présenté des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats du dosage des polyphénols totaux dans l'extrait acétonique montrent que l'ail renferme la plus grande proportion (833.98 ± 14.90 mg EAG/100g PS) suivies

par l'échalote (310.53 ± 23.28 mg EAG/100g PS), poireau (282.53 ± 12.52 mg EAG/100g PS), le poireau sauvage (75.11 ± 7.95 mg EAG/100 g PS), et enfin ail triquètre (157.34 ± 8.68 mg EAG/100 g PS).

Cependant, les résultats obtenus de dosage des polyphénols totaux dans l'extrait méthanolique montrent que les feuilles d'ail sont significativement les plus riches en composés phénoliques ($413,75 \pm 29.92$ mg EAG/100g PS) suivi par l'échalote ($383,32 \pm 15.72$ mg EAG/100gPS), Poireau ($216,2632 \pm 26.02$ mg EAG/100gPS), Poireau sauvage ($205,25 \pm 10.31$ mg EAG/100gpS) et enfin ail triquètre ($85,04 \pm 8.43$ mg EAG/100g PS). Le meilleur solvant d'extraction des composés phénoliques est l'acétone, car les concentrations des polyphénols totaux est plus importante, comparée à celle de l'extrait méthanolique. Les études de Chekki *et al.* (2014) indiquent un taux de polyphénols totaux élevé dans les extrait éthanolique de l'ail (436mg EAG/100g) par rapport aux extrait méthanolique de la même plante (500 mg EAG/100g), tandis que Epaminondas *et al.* (2015) qui ont travaillé sur l'extrait éthanolique de l'ail originaire du Brésil, signale une teneur de (105,5 mg EAG/100g) et qui est une valeur moins considérable. D'autre par Kallel *et al.* (2014) ont montré que l'extrait méthanolique renferme un taux de phénols totaux (228,3 mg EAG/100g) représentant le double de celui de l'extrait éthanolique (118 mg EAG/100g), tandis que l'extrait aqueux ne peut extraire qu'une quantité de (297 mg EAG/100g) de phénols totaux, seulement.

En parallèle, les travaux réalisés sur *Allium sativum*, dans différentes régions du monde, montrent que la teneur des polyphénols totaux n'est pas toujours la même que celle de l'*Allium sativum* de notre région.

Cette différence entre les résultats trouvés peut être due à divers facteurs, notamment, les conditions environnementales, climatiques et la période de récolte, sans oublier les conditions expérimentales et le capital génétique, héréditaire.

V.3.2. Flavonoïdes :

Le dosage des flavonoïdes a été réalisé selon la méthode de trichlorure d'aluminium (ALCL₃). La quantification des flavonoïdes a été déterminée en fonction d'une courbe d'étalonnage linéaire réalisée à partir d'une solution étalon de catéchine à différentes concentrations, le calcul de la teneur en flavonoïdes dans les différents échantillons est donc exprimé en mg équivalent de catéchine par 100gramme de résidu sec d'extrait (mg EC/100g) (Moumene, 2016).

Les teneurs en flavonoïdes des extraits des cinq plantes Alliées varient selon le solvant d'extraction d'une manière significative ($p < 0.05$) à l'exception de l'ail et l'échalote la différence n'est pas significative entre les deux solvants. Les teneurs sont présentées dans la figure 19.

La figure 19 indique que l'extrait acétonique de l'ail triquètre renferme la quantité la plus élevée des flavonoïdes, avec une valeur de 249.13 ± 5.77 mg EC/100gPS suivie par l'extrait acétonique de poireau avec une valeur de $231,34 \pm 6.80$ mg EC/100gPS, Echalote $185, 58 \pm 10.93$ mg EC/100g PS, ail $99,14 \pm 1.03$ mg EC/g PS et le Poireau sauvage ne renferme que 71.18 ± 6.34 mg EC/g PS. Tandis que la teneur la plus élevée en flavonoïdes de l'extrait méthanolique est celle de l'échalote $175,41 \pm 13.7$ mg EC/100gPS, Ail $100,41 \pm 3.33$ mg EC/100g PS, Poireau $59,7 \pm 6.34$ mg EC/100g PS, Poireau sauvage $30, 5 \pm 3.64$ mg EC/100g PS et Ail triquètre avec une teneur faible $10,16 \pm 4.9$ mg EC/100g PS.

En comparant nos résultats avec les valeurs trouvées par Chekki *et al.* (2014) et celle de Kallel *et al.* (2014) qui ont travaillé sur l'ail cultivé, nous constatons que les teneurs en flavonoïdes sont moins remarquables. Pour le premier auteur, il annonce des teneurs de 132 mg EC/ 100g PS dans l'extrait éthanolique et 42 mg EC/100 g PS dans l'extraits méthanolique.

L'étude statistique montre que les teneurs en flavonoïdes totaux des différents extraits ont présenté des différences significatives ($p < 0.05$), à l'exception d'Ail (acétone et méthanol) et l'échalote (acétone et méthanol) la différence n'est pas significative.

Figure 19: Les teneurs en Flavonoïdes totaux des méthanoliques et acétoniques des feuilles des plantes étudiés.

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; $a > b > c > d > e > f > g > h$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

V.3.3. Proanthocyanidines :

Les proanthocyanidines sont des composés biologiquement actifs, ils résultent de la polymérisation auto-oxydative ou enzymatique des unités de flavan-3,4-diol liées majoritairement par les liaisons C4-C8 des unités adjacentes; et se nomment ainsi proanthocyanidines de type B. Lorsque la condensation se produit entre les unités adjacentes par la liaison C4-C8 et par une liaison d'éther additionnelle entre C2 et C7, les proanthocyanidines sont dits de type A. Plusieurs essais *in vivo* ont démontrés leurs propriétés anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes et antioxydantes. Ils peuvent également diminuer la valeur nutritive et la disponibilité biologique des protéines et des minéraux, lorsqu'ils sont présents en quantités suffisantes (Malik *et al.*, 1997).

Les résultats de la quantification des proanthocyanidines des extraits sont illustrés dans la figure 20.

L'analyse statistique révèle une différence significative ($p < 0.05$) de la teneur en proanthocyanidines des feuilles des cinq plantes.

Les concentrations la plus élevée en proanthocyanidines de l'extrait acétonique de différentes plantes est celle de ail $80,31 \pm 0.37$ mg EC/100g, poireau $65,09 \pm 0.24$ mg EC/100g, ail triquètre $52,9631 \pm 0.74$ mg EC/100g, échalote $48,26 \pm 1.23$ mg EC/100g et Poireau sauvage $25,86 \pm 0.37$ mg EC/100g. Par contre les teneurs des extrait méthanoliques est faibles pour le Poireau $35,64 \pm 0.49$ mg EC/100g, Ail $32,17 \pm 0.49$ mg EC/100g, échalote $30,56 \pm 0.37$ mg EC/100g, Poireau sauvage $14,35 \pm 0.24$ mg EC/100g et la teneur la plus faible est celle de l'Ail triquètre $4,57 \pm 1.60$ mg EC/100g.

Figure 20: Les teneurs en proanthocyanidines des extrait méthanoliques et acétoniques des feuilles des plantes étudiées

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives (p<0.05).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; a>b>c>d>e>f>g>h>i>j.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

V.4. Activité antioxydante :

V.4.1. Pouvoir réducteur

Le test du pouvoir réducteur est un bon indicateur de la capacité antioxydante qui détermine le potentiel de réduction du fer ferrique du complexe ferricyanure Fe^{+3} en fer ferreux Fe^{+2} (Küçük et al., 2007; Soares *et al.*, 2009) selon la réaction suivante:

Les résultats du pouvoir réducteur des échantillons analysés à différentes concentrations sont représentés sur la (figure 21). Les résultats obtenus montrent que le pouvoir réducteur augmente avec l'augmentation des concentrations des extraits méthanoliques et acétoniques ce qui montre la présence de composés actifs ayant un pouvoir réducteur. D'après le graphe les extraits acétoniques d'échalote et de poireau présentent un pouvoir réducteur élevé qui est supérieur à celui du Trolox suivi par l'extrait acétonique de l'ail, l'extrait méthanolique du poireau, l'extrait méthanolique d'échalote et l'extrait méthanolique de l'ail.

Figure21 : Graphe du pouvoir réducteur en fonction des concentrations des extraits des plantes.

La figure 21 montre le pouvoir réducteur des extraits méthanolique et acétonique des plantes étudiées à une concentration de 0.03 g/ml de poudre sèche.

Le pouvoir réducteur des extraits acétoniques la plus élevée est celle de poireau (1.27 ± 0.021) suivie de l'ail (1.03 ± 0.02), ail (0.19 mg/ml^{-1}), échalote (0.804 ± 0.07), ail triquètre (0.23 ± 0.001) et poireau sauvage (0.115 ± 0).

Les résultats des extraits méthanoliques montrent que le pouvoir réducteur de l'échalote est la plus élevée (1.53 ± 0.03) suivie de poireau (0.911 ± 0.001), ail (0.54 ± 0.06), ail triquètre (0.40 ± 0.003) et Poireau sauvage (0.023 ± 0).

Figure22 : Pouvoir réducteur des feuilles des cinq plantes Alliées.

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre décroissant ; $a > b > c > d > e > f > g > h > i > j$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

Les tests de corrélation du pouvoir réducteur avec les différentes classes de composés phénoliques suggèrent la présence d'autres composés bioactifs qui pourraient contribuer aux pouvoir réducteur des échantillons testés figure 23(a, b, c). En effet les plantes de la famille des Alliacées sont riches en sucres et les saponines qui possèdent une activité réductrice (Lanzotti *et al.*, 2012; Wuyts, 2013).

Figure 23 : Corrélations entre le pouvoir réducteur des extraits des plantes et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c)

V.4.2. Activité antiradicalaire 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH) :

L'activité antioxydante des différents extraits de plantes vis-à-vis du radical DPPH est évaluée par spectrophotomètre en suivant la réduction de ce radical (Chang et al., 2007). Les antioxydants interagissent avec le DPPH en lui transférant un électron ou un atome d'hydrogène ce qui entraîne sa neutralisation, par conséquent la couleur change de pourpre vers le jaune (Kubola and Siriamornpun, 2008).

Les résultats d'IC₅₀ sont représentés sur le tableau II :

Tableau II : Résultats d'IC₅₀ des cinq plantes.

Echantillon	IC ₅₀
Echalote méthanol	2,59
Echalote acétone	0,54
Ail méthanol	6,1
Ail acétone	5,18
Ail triquètre méthanol	9,27
Ail triquètre acétone	7,66
Poireau méthanol	4,88
poireau Acétone	1,53
Poireau sauvage méthanol	15,7
Poireau sauvage acétone	9,3

Les résultats de l'activité anti radicalaire (1/IC₅₀) des extraits de plantes sont représentés sur la (figure 24).

Les résultats de la présente étude montrent la présence d'une différence significative ($p < 0.05$) d'une plante à un autre.

L'activité antiradicalaire des extraits acétoniques la plus élevée est celle de l'échalote $(1.84\text{mg/ml})^{-1}$ suivie de poireau $(0.65\text{mg/ml})^{-1}$, ail $(0.19\text{mg/ml})^{-1}$, ail triquètre en $(0.13\text{mg/ml})^{-1}$ et poireau sauvage $(0.11\text{mg/ml})^{-1}$ (Voir annexe).

Les résultats des extraits méthanoliques montre que l'activité antiradicalaire de l'échalote est la plus élevée $(0.38\text{mg/ml})^{-1}$ suivie de ail $(0.16\text{mg/ml})^{-1}$, ail triquètre $(0.16\text{mg/ml})^{-1}$, poireau $(0.2\text{mg/ml})^{-1}$ et poireau $(0.06\text{mg/ml})^{-1}$. Les résultats des extraits des extraits méthanoliques et acétoniques montre une différence significative par rapport au Trolox (Voir annexe).

Figure 24: Activité « scavenger » de radical libre DPPH des extraits des plantes.

. Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre croissant ; $a > b > c > d > e > f$.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

Les composés phénoliques, les flavonoïdes et le proanthocyanidines semblent contribuer de manière importante au potentiel réducteur des extraits acétonique et méthanolique des plantes. Les coefficients de corrélations linéaires entre ces classes d'antioxydant et le pouvoir anti radicalaire (DPPH) sont de 0.409 et 0.772 respectivement Figure 25 (a, b, c).

Figure 25: Corrélations entre l'activité antiradicalaire (DPPH) des extraits des plantes et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c).

V.4.3. Effet «scavenger» sur le peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) :

Le peroxyde d'hydrogène est génère in vivo par dismutation du radical peroxyde (O₂⁻) soit d'une manière spontanée ou catalysée par le superoxydedismustase. C'est un oxydant moins

réactif que d'autres espèces réactives d'oxygène. Cependant il constitue une source potentielle de molécules hautement réactives (Moumen *et al.*, 1997).

Les résultats de l'activité anti radicalaire des extraits de plantes sont représentés sur la figure 26.

L'effet « scavenger » des extraits sur H_2O_2 est représenté dans la figure .Il varie de 70.54 ± 3.54 % (poireau) à 97.3 ± 2.2 % (Poireau sauvage) pour les extraits méthanoliques. Poireau sauvage (97.3 ± 2.2 %) est plus efficace que les autres plantes suivie de l'ail triquètre (91.98 ± 1.6 %), échalote (81.68 ± 3.4 %), ail (79.71 ± 1.32 %) et poireau (70.54 ± 3.54 %).

Dans le cas des extraits acétoniques l'effet « scavenger » des extraits sur H_2O_2 varie de 13.87 ± 1.5 % (ail) à 89.1 ± 1.43 %(ail triquètre).les feuilles l'ail triquètre ont des pourcentages d'inhibition de H_2O_2 plus élevé suivie de l'échalote (67.07 ± 2.4 %), poireau (35.89 ± 0.54), poireau sauvage (24.25 ± 2.65) et l'ail (13.87 ± 1.5).

L'étude statistique de l'effet «scavenger» des extraits des plantes sur le H_2O_2 montre que les différents extraits ont présenté des différences significatives ($p < 0.05$), à l'exception de l'Ail triquètre la différence n'est pas significatives entre l'extrait acétonique et l'extrait méthanolique.

Figure26 : Effet «scavenger» des extraits des plantes sur le H_2O_2 .

Toutes les valeurs sont exprimées par la moyenne de trois essais (n=3).

Les valeurs désignées par les lettres différentes présentent des différences significatives ($p < 0.05$).

Les résultats sont classés par ordre croissant ; a>b>c>d>e>f.

Les barres verticales représentent les écarts-types.

Il n'y a pas une bonne corrélation linéaire entre l'effet « scavenger » sur H₂O₂ et les teneurs en composés phénoliques des extraits des feuilles des cinq plantes (figure 27).

Figure 27: Corrélations de l'effet scavenger sur le H₂O₂ et les polyphénols (a), les flavonoïdes (b) et les proanthocyanidines (c).

CONCLUSION
ET

PERSPECTIVES

Conclusion et perspectives

Le présent travail consiste en l'évaluation de l'activité antioxydante des feuilles de cinq plantes Alliaceae récoltées à partir de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Bejaia ; *Allium sativum.L*, *Allium ascalonicum*, *Allium porrum*, *Allium triquetrum* et *Allium ampeloprasum*.

Les teneurs en composé phénoliques (polyphénols totaux, flavonoïdes et proanthocyanidines) ont été déterminées à partir de leur dosage par des méthodes colorimétriques. L'évaluation de l'activité antioxydante a été déterminé à partir du pouvoir réducteur, l'effet « scavenger » sur l' H_2O_2 et l'activité antiradicalaire (DPPH) afin de comparer entre les teneurs en composés phénoliques et l'activité antioxydante des plantes étudiées.

L'ail présente la teneur la plus élevée en polyphénols totaux avec 833.98 ± 14.90 mg EAG/100g de poudre sèche dans l'extrait acétonique et $413,75 \pm 29.92$ mg GAE/100g de poudre sèche dans l'extrait méthanolique. L'extrait acétonique de l'ail triquètre renferme la quantité la plus élevé des flavonoïdes, avec une valeur de 249.13 ± 5.77 mg EC/100g. La teneur la plus élevée en proanthocyanidines est observée chez l'extrait acétonique de l'ail qui est de $80,31 \pm 0.37$ mg EC/100g de poudre sèche, par contre pour les extrait méthanolique la teneur en proanthocyanidines est faible. L'analyse de l'activité antioxydante par la mesure du pouvoir réducteur a révélée que le pouvoir réducteur augmente avec l'augmentation des concentrations des extraits méthanoliques et acétoniques.

L'activité antiradicalaire (DPPH) des extraits acétoniques et méthanolique la plus élevé est celle de l'échalote $(1.84\text{mg/ml})^{-1}$, $(0.38\text{mg/ml})^{-1}$ respectivement. L'étude statistique de l'effet «scavenger» des extraits des plantes sur le H_2O_2 varie de 70.54 ± 3.54 % (poireau) à $97.3 \pm 2.2\%$ (Poireau sauvage) dans l'extrait méthanolique par contre dans l'extrait acétonique est de 70.54 ± 3.54 %(poireau) à $97.3 \pm 2.2\%$ (Poireau sauvage).

La variation de l'activité antioxydante et celle des antioxydants dans les différentes espèces étudiés est à la fois qualitative et quantitative.

Les testes de corrélation montre une bonne corrélation entre la teneur en polyphénols totaux et l'activité anti-radicalaire (DPPH), contrairement au pouvoir réducteur et l'effet« scavenger » sur le H_2O_2 . Ces résultats suggèrent la présence d'autres molécules ayant une activité antioxydante comme les saponosides.

Enfin, il serait aussi intéressant d'orienter les recherches scientifiques vers la réalisation des études approfondies et complémentaires de la composition, de l'activité antibactérienne et anti-inflammatoire des composés phénoliques. Il est aussi important de suivre cette étude par des applications *in vivo* afin d'évaluer l'effet des plantes Alliaceae sur l'organisme vivant.

REFERENCE

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIQUES

A

Abbassi, K., Mergaoui, L., Atay-Kadiri, Z., Ghaout, S., Stambouli, A., 2005. Activités biologiques des feuilles de *Peganum harmala* (Zygophyllaceae) en floraison sur la mortalité et l'activité génésique chez le criquet pèlerin Biological activities of *Peganum harmala* (Zygophyllaceae) leaves at floral stage on the mortality and reproductive activity of the desert locust. *Zoologica baetica* 16, 31-46.

B

Baba Aissa, F., 1999. Encyclopédie des plantes utiles. Flore d'Algérie et du Maghreb. Substances végétales d'Afrique, d'Orient et d'Occident", Librairie Moderne Rouiba, EDAS, Alger.

Basli, A., Chibane, M., Madani, K., Oukil, N., 2012. Activité antibactérienne des polyphénols extraits d'une plante médicinale de la flore d'Algérie: *Origanum glandulosum* Desf. *Phytothérapie* 10, 2-9.

Bernaert, N., De Paepe, D., Bouten, C., De Clercq, H., Stewart, D., Van Bockstaele, E., De Loose, M., Van Droogenbroeck, B., 2012. Antioxidant capacity, total phenolic and ascorbate content as a function of the genetic diversity of leek (*Allium ampeloprasum* var. *porrum*). *Food chemistry* 134, 669-677.

Beta, T., Nam, S., Dexter, J.E., Sapirstein, H.D., 2005. Phenolic content and antioxidant activity of pearled wheat and roller-milled fractions. *Cereal Chemistry* 82, 390-393.

Bidié, A., N'guessan, B.B., Yapo, A.F., N'guessan, J., Djaman, A., 2011. Activités antioxydantes de dix plantes médicinales de la pharmacopée ivoirienne. *Sciences & Nature* 8, 1-12.

Block, E., Putman, D., Zhao, S.H., 1992. *Allium* chemistry: GC-MS analysis of thiosulfinates and related compounds from onion, leek, scallion, shallot, chive, and Chinese chive. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 40, 2431-2438.

Bock, B., 2014. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine réalisé dans le cadre d'une convention entre le Ministère chargé de l'Écologie, le MNHN, la FCBN et Tela Botanica. Éditeur Tela Botanica. Version 2.01 du 14 février 2014.

Bogin, E., ABRAMS, M., EARON, Y., 1984. Effect of garlic extract on red blood cells. *Journal of Food Protection* 47, 100-101.

Boullard, B., 2001. Plantes médicinales du monde: croyances et réalités. De Boeck Secundair.

Bouterfas, K., 2011. Étude de *Marrubium vulgare* L. du mont de Tessala (Algérie occidentale): autoécologie, histologie, quantification de quelques polyphénols et évaluation du

pouvoir antimicrobien des flavonoïdes. Mémoire de magister, université de Sidi Bel Abbes 244.

Bozin, B., Mimica-Dukic, N., Samojlik, I., Goran, A., Igetic, R., 2008. Phenolics as antioxidants in garlic (*Allium sativum* L., Alliaceae). *Food chemistry* 111, 925-929.

Brandwein, B.J., 1965. The pigments in three cultivars of the common onion (*Allium cepa*). *Journal of Food Science* 30, 680-685.

Bruneton, J., 1993. *Plantes Médicinales: Phytochimie, Pharmacognosie*. 2^{ème} Ed. Lavoisier, New York 914.

Bruneton, J., 1999. *Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants*. Intercept Limited.

Bruneton, J., 2009a. *Pharmacognosie-Phytochimie, plantes médicinales*. 4^{ème} édition, Tec & Doc, Lavoisier. Paris.

Bruneton, J., 2009b. *Pharmacognosie-Phytochimie, plantes médicinales*”, 4^e éd, revue et augmentée, Tec & Doc-Éditions médicales internationales. Paris, 1288p.

C

Chang, H.-Y., Ho, Y.-L., Sheu, M.-J., Lin, Y.-H., Tseng, M.-C., Wu, S.-H., Huang, G.-J., Chang, Y.-S., 2007. Antioxidant and free radical scavenging activities of *Phellinus merrillii* extracts. *Botanical Studies* 48, 407-417.

Chekki, R.Z., Snoussi, A., Hamrouni, I., Bouzouita, N., 2014. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of Tunisian garlic (*Allium sativum*) essential oil and ethanol extract. *Mediterranean Journal of Chemistry* 3, 947-956.

Corea, G., Fattorusso, E., Lanzotti, V., 2003. Saponins and Flavonoids of *Allium triquetrum*. *Journal of Natural Products* 66, 1405-1411.

Couplan, F., 1998. *Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées*. Delachaux et Niestlé.

Cowan, M.M., 1999. Plant products as antimicrobial agents. *Clinical microbiology reviews* 12, 564-582.

Crozier, A., Clifford, M.N., Ashihara, H., 2008. *Plant secondary metabolites: occurrence, structure and role in the human diet*. John Wiley & Sons.

D

Darbyshire, B., Henry, R., 1981. Differences in fructan content and synthesis in some *Allium* species. *New Phytologist* 87, 249-256.

Dini, I., Tenore, G.C., Trimarco, E., Dini, A., 2005. Furostanol saponins in *Allium caepa* L. Var. *tropeana* seeds. *Food chemistry* 93, 205-214.

Dion, M.E., Agler, M., Milner, J.A., 1997. S-allyl cysteine inhibits nitrosomorpholine formation and bioactivation.

Dugravot, S., 2004. Les composés secondaires soufrés des Allium: Rôle dans les systèmes de défense du poireau et actions sur la biologie des insectes. Université François Rabelais-Tours.

E

Edenharder, R., Grünhage, D., 2003. Free radical scavenging abilities of flavonoids as mechanism of protection against mutagenicity induced by tert-butyl hydroperoxide or cumene hydroperoxide in *Salmonella typhimurium* TA102, *Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis*, pp. 1-18.

Epaminondas, P.S., Araújo, K.L., Nascimento, J.A., Souza, A.L., Rosenhaim, R., Souza, A.G., 2015. Assessment of the antioxidant effect of ethanol extract of *Allium sativum* L., isolated and/or synergistically associated with synthetic antioxidants, applied to linseed oil. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry* 120, 617-625.

F

Fawcett, C., Spencer, D., 1970. Plant chemotherapy with natural products. *Annual Review of Phytopathology* 8, 403-418.

Fawole, O.A., Opara, U.L., Theron, K.I., 2012. Chemical and phytochemical properties and antioxidant activities of three pomegranate cultivars grown in South Africa. *Food and Bioprocess Technology* 5, 2934-2940.

Fenwick, G.R., Hanley, A.B., Whitaker, J.R., 1985. The genus *Allium*—part 1. *Critical Reviews in Food Science & Nutrition* 22, 199-271.

Fleischauer, A.T., Poole, C., Arab, L., 2000. Garlic consumption and cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancers—. *The American journal of clinical nutrition* 72, 1047-1052.

Fritsch, R.M., Keusgen, M., 2006. Occurrence and taxonomic significance of cysteine sulphoxides in the genus *Allium* L.(Alliaceae). *Phytochemistry* 67, 1127-1135.

Fusco, D., Colloca, G., Monaco, M.R.L., Cesari, M., 2007. Effects of antioxidant supplementation on the aging process. *Clinical interventions in aging* 2, 377.

Garcia-Salas, P., Morales-Soto, A., Segura-Carretero, A., Fernández-Gutiérrez, A., 2010. Phenolic-compound-extraction systems for fruit and vegetable samples. *Molecules* 15, 8813-8826.

G

Goetz, P., Drouard, A., Stoltz, P., Delaporte, D., 2009. *Le Ginseng: Vertus thérapeutiques d'une plante adaptogène*. Springer Science & Business Media.

Goetz, P., Ghedira, K., 2012. *Phytothérapie anti-infectieuse*. Springer Science & Business Media.

Références bibliographiques

- Goetz, P.e., al, 2012. Phytothérapie anti-infectieuse. Springer Science & Business Media.
- Goudable, J., Favier, A., 1997. Radicaux libres oxygénés et antioxydants. Nutrition clinique et métabolisme 11, 115-120.
- Guignard, J., 1996. Abrégés de Botanique. 10ème édition Masson Paris.
- Gutteridge, J., 1995. Lipid peroxidation and antioxidants as biomarkers of tissue damage. Clinical chemistry 41, 1819-1828.

H

- Halliwell, B., 1996. Mechanisms involved in the generation of free radicals. Pathologie-biologie 44, 6-13.
- Halliwell, B., 2011. Free radicals and antioxidants—quo vadis? Trends in pharmacological sciences 32, 125-130.
- Haslam, E., 1996. Natural polyphenols (vegetable tannins) as drugs: possible modes of action. Journal of Natural Products 59, 205-215.
- Havsteen, B.H., 2002. The biochemistry and medical significance of the flavonoids. Pharmacology & therapeutics 96, 67-202.
- Hirschegger, P., Jakše, J., Trontelj, P., Bohanec, B., 2010. Origins of *Allium ampeloprasum* horticultural groups and a molecular phylogeny of the section *Allium* (*Allium*: Alliaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 54, 488-497.

J

- Judd, W.S., Campbell, C.S., Kellogg, E.A., Stevens, P., 2002. Botanique systématique: une perspective phylogénétique. De Boeck Supérieur.

K

- Kallel, F., Driss, D., Chaari, F., Belghith, L., Bouaziz, F., Ghorbel, R., Chaabouni, S.E., 2014. Garlic (*Allium sativum* L.) husk waste as a potential source of phenolic compounds: Influence of extracting solvents on its antimicrobial and antioxidant properties. Industrial Crops and Products 62, 34-41.
- Kawashima, K., Mimaki, Y., Sashida, Y., 1993. Steroidal saponins from the bulbs of *Allium schubertii*. Phytochemistry 32, 1267-1272.
- Koch, H.P., 1996. Der lange Weg zum „geruchlosen Knoblauch” . Pharmazie in unserer Zeit 25, 186-191.
- Kodaira, E., MORI, G., IMANISHI, H., 2000. Effects of Storage Temperatures on Flowering of *Allium triquetrum* L. Environment Control in Biology 38, 47-50.

Références bibliographiques

Koné, D., 2009. Enquête ethnobotanique de six plantes médicinales maliennes: extraction, identification d'alcaloïdes-caractérisation, quantification de polyphénols: étude de leur activité antioxydante. Metz.

Ksouri, R., Megdiche, W., Debez, A., Falleh, H., Grignon, C., Abdelly, C., 2007. Salinity effects on polyphenol content and antioxidant activities in leaves of the halophyte *Cakile maritima*. *Plant Physiology and Biochemistry* 45, 244-249.

Kubola, J., et Siriamornpun, S., 2008. Phenolic contents and antioxidant activities of bitter melon (*Momordica charantia* L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro. *Food chemistry* 110, 881-890.

Küçük, M., Kolaylı, S., Karaoğlu, Ş., Ulusoy, E., Baltacı, C., Candan, F., 2007. Biological activities and chemical composition of three honeys of different types from Anatolia. *Food chemistry* 100, 526-534.

L

Lachman, J., Pronek, D., Hejtmánková, A., Dudjak, J., Pivec, V., Faitová, K., 2003. Total polyphenol and main flavonoid antioxidants in different onion (*Allium cepa* L.) varieties. *Scientia horticulturae* 30, 142-147.

Lanzotti, V., 2006. The analysis of onion and garlic. *Journal of chromatography A* 1112, 3-22.

Lanzotti, V., Romano, A., Lanzuise, S., Bonanomi, G., Scala, F., 2012. Antifungal saponins from bulbs of white onion, *Allium cepa* L. *Phytochemistry* 74, 133-139.

Le Bon, A.-M., 2016. Alliacées et prévention des cancers. *Phytothérapie* 14, 159-164.

Liu, X., Zhao, M., Wang, J., Yang, B., Jiang, Y., 2008. Antioxidant activity of methanolic extract of emblica fruit (*Phyllanthus emblica* L.) from six regions in China. *Journal of food composition and Analysis* 21, 219-228.

M

Macheix, J.-J., Fleuriet, A., Jay-Allemand, C., 2005. Les composés phénoliques des végétaux: un exemple de métabolites secondaires d'importance économique. PPUR presses polytechniques.

Mahmoudi, S., Khali, M., Mahmoudi, N., 2013. Etude de l'extraction des composés phénoliques de différentes parties de la fleur d'artichaut (*Cynara scolymus* L.). *Nature & Technology*, 35.

Malik, A., Kuliev, Z., Akhmedov, Y.A., Vdovin, A., Abdullaev, N., 1997. Proanthocyanidins of *Ziziphus jujuba*. *Chemistry of natural compounds* 33, 165-173.

Marcheix, J., Fleuriet, A., Jay-Allemand, C., 2005. Les composés phénoliques des végétaux.

- Mazza, G., Oomah, B., 2000. Chemistry and pharmacology of fenugreek in Herbs, Botanicals and Teas. CRC Press.
- Menvielle-Bourg, F.J., 2005. La superoxyde dismutase, puissant antioxydant naturel, désormais disponible par voie orale. *Phytothérapie* 3, 118-121.
- Messiaen, C.-H., 1993. Les Allium alimentaires reproduits par voie végétative. Editions Quae.
- Michahelles, E., 1974. Über neue Wirkstoffe aus Knoblauch (*Allium sativum* L.) und Küchenzwiebel (*Allium cepa* L.). na.
- Middleton, E., Kandaswami, C., Theoharides, T.C., 2000. The effects of plant flavonoids on mammalian cells: implications for inflammation, heart disease, and cancer. *Pharmacological reviews* 52, 673-751.
- Mochizuki, E., Yamamoto, T., Suzuki, S., Nakazawa, H., 1996. Electrophoretic identification of garlic and garlic products. *Journal of AOAC International* 79, 1466-1470.
- Molyneux, P., 2004. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. *Songklanakarin J. Sci. Technol* 26, 211-219.
- Morita, U., Tsuyoshi, Hayashi, N., Matsuura, H., Itakura, Y.F., Toru 1988. Steroidal saponins from elephant garlic, bulbs of *Allium ampeloprasum* L. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* 36, 3480-3486.
- Moumen, R., Nouvelot, A., Duval, D., Lechevaliera, B., Viadera, F., 1997. Plasma superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity in sporadic amyotrophic lateral sclerosis. *Journal of the neurological sciences* 151, 35-39.
- Moumene, F., 2016. Valorisation des plantes condimentaires cultivées et spontanées dans l'ouest algérien cas du genre *Allium*.

N

- Najjaa, H., Zouari, S., Arnault, I., Auger, J., Ammar, E., Neffati, M., 2011. Différences et similitudes des métabolites secondaires chez deux espèces du genre *Allium*, *Allium roseum* L. et *Allium ampeloprasum* L. *Acta Botanica Gallica* 158, 111-123.
- Nawaz, H., Shi, J., Mittal, G.S., Kakuda, Y., 2006. Extraction of polyphenols from grape seeds and concentration by ultrafiltration. *Separation and Purification Technology* 48, 176-181.
- Nijveldt, R.J., Van Nood, E., Van Hoorn, D.E., Boelens, P.G., Van Norren, K., Van Leeuwen, P.A., 2001. Flavonoids: a review of probable mechanisms of action and potential applications-. *The American journal of clinical nutrition* 74, 418-425.
- Noleau, I., Richard, H., Peyroux, A.-S., 1991. Volatile compounds in leek and asafoetida. *Journal of Essential Oil Research* 3, 241-256.

O

O'Kennedy, R., Zhorenes, R., 1997. Coumarins: Biology Applications and Mode of Action John Wiley and Sons. Chichester.

P

Pastre, J., Priymenko, N., 2007. Intérêt des anti-oxydants dans l'alimentation des carnivores domestiques. *Revue de médecine vétérinaire* 1, 180-189.

Pinto, J.T., Krasnikov, B.F., Cooper, A.J., 2006. Redox-sensitive proteins are potential targets of garlic-derived mercaptocysteine derivatives. *The Journal of nutrition* 136, 835S-841S.

Prasad, K., Mantha, S.V., Kalra, J., Lee, P., 1997. Prevention of hypercholesterolemic atherosclerosis by garlic, an antioxidant. *Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics* 2, 309-319.

Q

Quézel, P., Santa, S., 1963. Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales.

R

Ribeiro, S., Barbosa, L., Queiroz, J., Knödler, M., Schieber, A., 2008. Phenolic compounds and antioxidant capacity of Brazilian mango (*Mangifera indica* L.) varieties. *Food chemistry* 110, 620-626.

Ribereau-Gayon, P., 1968. Notions générales sur les composés phénoliques, méthodes générales d'études des composés phénoliques. *Les composés phénoliques des végétaux*.

Rubat du Merac, M.L., 1949. Recherches sur le métabolisme glucidique du genre *Allium* et en particulier d'*Allium ursinum* L. Paris: These Fac. Sci. Univ. Acc. to Ekberg (Bot. Not. 125 (1972) 87-92) he has described anatomy of *A. ursinum*. *Alliaceae*** (PMBD, 185103268).

Ruch, R.J., Cheng, S.-j., Klaunig, J.E., 1989. Prevention of cytotoxicity and inhibition of intercellular communication by antioxidant catechins isolated from Chinese green tea. *Carcinogenesis* 10, 1003-1008.

S

Samaranayake, M., Wickramasinghe, S., Angunawela, P., Jayasekera, S., Iwai, S., Fukushima, S., 2000. Inhibition of chemically induced liver carcinogenesis in Wistar rats by garlic (*Allium sativum*). *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives* 14, 564-567.

Scalbert, A., 1991. Antimicrobial properties of tannins. *Phytochemistry* 30, 3875-3883.

Schreyen, L., Dirinck, P., Van Wassenhove, F., Schamp, N., 1976. Volatile flavor components of leek. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 24, 336-341.

Sies, H., Stahl, W., Sundquist, A.R., 1992. Antioxidant functions of vitamins. *Annals of the New York Academy of Sciences* 669, 7-20.

Soares, A.A., de Souza, C.G.M., Daniel, F.M., Ferrari, G.P., da Costa, S.M.G., Peralta, R.M., 2009. Antioxidant activity and total phenolic content of *Agaricus brasiliensis* (*Agaricus blazei* Murril) in two stages of maturity. *Food chemistry* 112, 775-781.

Stalikas, C.D., 2007. Extraction, separation, and detection methods for phenolic acids and flavonoids. *Journal of separation science* 30, 3268-3295.

Starke, H., Herrmann, K., 1976. Flavonols and flavones of vegetables. VII. Flavonols of leek, chive and garlic (author's transl). *Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung* 161, 25-30.

T

Tattelman, E., 2005. Health effects of garlic. *American family physician* 72.

Teuscher, E., Anton, R., Lobstein, A., 2005. *Plantes aromatiques: épices, aromates, condiments et huiles essentielles*.

Timite, G., 2012. Isolement et caractérisation des saponosides de plantes de la famille des Alliaceae, Caryophyllaceae et Polygalaceae, et évaluation de leurs activités cytotoxiques sur cellules tumorales. Dijon.

V

Vu, Q.H., Hang, T.T.M., Yaguchi, S., Ono, Y., Pham, T.M.P., Yamauchi, N., Shigyo, M., 2013. Assessment of biochemical and antioxidant diversities in a shallot germplasm collection from Vietnam and its surrounding countries. *Genetic resources and crop evolution* 60, 1297-1312.

W

Wuyts, D., 2013. Oignon—*Allium cepa*, bulbe. *Phytothérapie* 11, 6-11. Y

Y

Yang, B., Wang, J., Zhao, M., Liu, Y., Wang, W., Jiang, Y., 2006. Identification of polysaccharides from pericarp tissues of litchi (*Litchi chinensis* Sonn.) fruit in relation to their antioxidant activities. *Carbohydrate research* 341, 634-638.

Yao, L.H., Jiang, Y., Shi, J., Tomas-Barberan, F., Datta, N., Singanusong, R., Chen, S., 2004. Flavonoids in food and their health benefits. *Plant foods for human nutrition* 59, 113-122.

Z

Zhishen, J., Mengcheng, T., Jianming, W., 1999. The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. *Food chemistry* 64, 555-559.

Glossaire

Androcée : Organes mâles de la fleur (étamines, anthères).

Angiosperme : Sous-embranchements groupant les plantes dont les ovules sont enfermés dans un ovaire clos (dans un fruit). En principe il englobe les plantes à fleurs, excepté les conifères.

Anthère : Partie terminale de l'étamine qui renferme le pollen.

Bractée = Spathe : Petite feuille qui recouvre la fleur avant son développement, située à la base du pédoncule floral.

Caïeux : petit bourgeon qui se forme à côté d'un bulbe mis en terre.

Chasmogamie : Comportement d'une fleur qui s'ouvre au moment où s'opère la pollinisation, rendant ainsi possible la fécondation croisée.

Friches : Terrains non cultivés.

Inflorescence : Ensemble de fleurs groupées en capitule, en épi, en ombelle.

Monocotylédones : Plantes dont la graine n'a qu'un seul cotylédon.

Pistil : Organe femelle de la fleur (gynécée), constitué d'un ou de plusieurs carpelles, et comprenant l'ovaire, le style et le stigmate.

Spathe : Bractée enveloppant une inflorescence ou parfois une simple fleur.

Supère : L'ovaire est placé au dessus des pétales, sépales et étamines.

Tépale : Une pièce florale externe et interne du périeanthe dont on ne peut pas dire s'il s'agit de pétale ou de sépale, lorsque les deux ont la même apparence. L'ensemble des tépales d'une fleur est appelé périgone.

Tetraploïdes : Qui possède dans ses cellules $4n$ chromosomes, le nombre diploïde $2n$ étant le nombre normal

Limbe : Partie principale, élargie et étalée de la feuille.

Vivace : se dit pour une plante qui vit plusieurs années.

Verticilles : Groupe de plus de deux feuilles qui naissent au même niveau sur la tige, en anneau.

ANNEXES

Annexe 1 : Courbe d'étalonnage des composés phénoliques.

Annexe 2 : Courbe d'étalonnage des flavonoïdes

Annexe3 : Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'échalote méthanol (3 essais)

Annexe4 : Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'échalote acétone (3 essais).

Annexe5 : Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de poireau méthanol (3 essais).

Annexe6 : Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de poireau acétone (3 essais).

Annexe7: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'ail triquètre méthanol (3 essais).

Annexe8: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'ail triquètre acétone (3 essais).

Annexe9: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'ail méthanol (3 essais).

Annexe10: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de l'ail acétone (3 essais).

Annexe11: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de poireau sauvage méthanol (3 essais).

Annexe12: Courbe d'étalonnage de l'activité antiradicalaire (DPPH) de poireau sauvage acétone (3 essais).

Annexe13: Courbe de Trolox (DPPH).

Annexe14: Courbe de Trolox (pouvoir réducteur).

Résumé

L'activité antioxydante des plantes aromatiques est due essentiellement à leur richesse en antioxydant. Les cinq espèces *Alliaceae* récoltées des régions de Tizi-Ouzou et Bejaia ont été extraites avec de l'acétone 70% et du méthanol 50 et 80% et leurs teneurs en composés phénoliques (polyphénols totaux, flavonoïdes et tanins) ont été mesurées dans les différents extraits. Puis, l'activité antioxydante a été évaluée en mesurant leur pouvoir réducteur, leur effet « scavenger » sur le peroxyde d'hydrogène et l'activité antiradicalaire (DPPH). Les teneurs en composés phénoliques déterminées selon la méthode de folin-ciocalteu, varient entre $(833.98 \pm 14.90 \text{ mg EAG}/100\text{g de poudre sèche})$ à $75.11 \pm 7.95 \text{ mg EAG}/100 \text{ g de poudre sèche}$ pour les extraits acétonique et $413,75 \pm 29.92 \text{ mg EAG}/100\text{g de poudre sèche}$ à $85,04 \pm 8.43 \text{ mg EAG}/100 \text{ de poudre sèche}$ pour les extraits méthanolique. Les teneurs en flavonoïdes sont comprises entre $249.13 \pm 5.77\text{mg EC}/100\text{g de poudre séché}$ et $71.18 \pm 6.34 \text{ mg EC}/\text{g poudre sèche}$. Celle des proanthocyanidines de $80,31 \pm 0.37\text{mg ECyn}/100\text{g de poudre sèche}$ à $25,86 \pm 0.37 \text{ mg ECyn}/100\text{g de poudre sèche}$. Le pouvoir réducteur et l'effet « scavenger » des extraits sur l' H_2O_2 ne montre pas une corrélation linéaire avec la teneur en composé phénoliques.

Mots clés : activité antioxydante, plantes *Alliaceae*, antioxydants, composés phénoliques, flavonoïdes, proanthocyanidines, pouvoir réducteur.

Abstract

The antioxidant activity of aromatic plants is mainly due to their high antioxidant content. The five *Alliaceae* species harvested from the Tizi-Ouzou and Bejaia regions were extracted with acetone 70% and methanol 50 and 80% and their contents in compounds Phenolic (total polyphenols, flavonoids and tannins) were measured in the various extracts, and the antioxidant activity was evaluated by measuring their reducing power, their scavenger effects on hydrogen peroxide and the antiradical activity (DPPH). The concentrations of phenolic compounds determined according to the folin-ciocalteu method vary between $833.98 \pm 14.90 \text{ mg AGE} /100\text{g of dried powder}$ to $75.11 \pm 7.95 \text{ mg AGE}/100\text{g dried powder}$ for the acetone extracts and $413.75 \pm 29.92 \text{ mg AGE} /100\text{g of dried powder}$ at $85.04 \pm 8.43 \text{ mg AGE} /100\text{g of dried powder}$ for methanolic extracts. The flavonoid contents are between $249.13 \pm 5.77\text{mg EC}/100\text{g of dried powder}$ and $71.18 \pm 6.34\text{mg EC} /\text{g of dried powder}$. That of the proanthocyanidins $80.31 \pm 0.37 \text{ mg ECyn} / 100\text{g of dried powder}$ at $25.86 \pm 0.37 \text{ mg ECyn} /100\text{g of dried powder}$.

The reducing power and the "scavenger" effect of the H_2O_2 extracts does not show a linear correlation with the phenolic compound content.

Key words: antioxidant activity, *Alliaceae* plants, antioxidants, phenolic compounds, flavonoids, proanthocyanidins, reducing power.